

PORESUSCITAČNÍ PÉČE

NEODKLADNÁ LÉČBA

Dýchací cesty a dýchání

- Udržujte SpO₂ v rozmezí 94–98 %
- Zajistěte dýchací cesty definitivním způsobem
- Kapnografie
- Ventilujte k dosažení normokapnie


Krevní oběh

- 12svodové EKG
- Zajistěte spolehlivý intravenózní vstup
- Udržujte systolický krevní tlak >100 mm Hg
- Podejte tekutiny (krystaloidní roztoky) k dosažení normovolémie
- Invazivní monitorování krevního tlaku
- Zvažte vazopresory/inotropika pro udržení systolického krevního tlaku

Kontrola tělesné teploty

- Udržujte tělesnou teplotu v rozmezí 32–36 °C
- Sedace; prevence svalového třesu

DIAGNOSTIKA



OPTIMALIZACE ZOTAVENÍ

Péče na JIP

- Kontrola tělesné teploty: konstantní tělesná teplota 32–36 °C po dobu ≥24 hodin; prevence horečky po dobu alespoň 72 hodin
- Udržujte normooxii a normokapnii; protektivní ventilace
- Zabraňte hypotenzi
- Echokardiografie
- Udržujte normoglykémii
- Diagnostikujte a zahajte léčbu křečí (EEG, sedace, antiepileptika)
- Prognózování odložte po dobu min. 72 hodin

Sekundární prevence
např. ICD, screening vrozených onemocnění, rizikové faktory

Funkční zhodnocení stavu před propuštěním

Strukturované sledování po propuštění z nemocnice

Rehabilitace